

# Allaitement et médicaments

## EXAMENS EN ENDOSCOPIE

**Vous allez subir un examen en endoscopie ?**

**Dans la vaste majorité des cas, l'allaitement peut se poursuivre par la suite.**

L'endoscopie permet de visualiser l'intérieur de différents conduits du corps à l'aide d'un tube flexible muni d'une caméra appelée endoscope. Ainsi, la **coloscopie** est l'exploration du côlon, la **gastroskopie**, celle de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum, la **bronchoscopie**, celle des bronches, la **cystoscopie**, celle de la vessie, l'**hystéroskopie**, celle de l'utérus, et la **cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)** sert à explorer les voies biliaires. Ces examens sont habituellement de courte durée, mais inconfortables, de là la sédation légère qu'on vous administrera.


### La coloscopie

Elle nécessite que le colon soit « propre », évacué des selles et résidus. Une diète faible en résidus et une préparation laxative sont alors prescrites. Les produits laxatifs utilisés sont compatibles avec l'allaitement.

Gardez-vous bien hydratée tout au long du processus. Il est avisé qu'une tierce personne soit disponible pour s'occuper de votre enfant durant la purgation colonique, durant l'examen et après celui-ci.

Discutez des points suivants avec votre équipe traitante :

- Informez-les que vous désirez allaiter votre enfant après la procédure
- Demandez la durée habituelle de la procédure et du séjour en salle de réveil



**Vous pouvez allaiter dès que vous êtes bien éveillée, que vous sentez alerte et que vous avez rejoint votre enfant après une endoscopie effectuée sous sédation et analgésie.**

**Il est sécuritaire que vous évitiez de partager le lit avec lui durant les heures et la nuit suivante.**

Le midazolam, le fentanyl ou le propofol sont compatibles avec l'allaitement. Comme il existe des alternatives plus sécuritaires, le diazépam et la mépéridine ne devraient pas être utilisés, mais si une dose est administrée, l'allaitement n'a pas à être suspendu et le lait n'a pas à être tiré et jeté.



### RÉFÉRENCES :

- <https://www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/endoscopie/>
- <https://www.breastfeedingnetwork.org.uk/wp-content/dibm/2019-09/Endoscopy%20and%20Breastfeeding.pdf>
- <https://associationofanaesthetists-publications.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/anae.15179>
- <https://www.breastfeedingnetwork.org.uk/wp-content/dibm/2019-09/Colonoscopy%20and%20Breastfeeding%20Mothers.pdf>
- Anderson PO. Laxative and Cathartic Use During Breastfeeding. BREASTFEEDING MEDICINE. 2021; 16(9): 675-7. DOI: 10.1089/bfm.2021.0133

**Nathalie Gagnon,  
pharmacienne, 2022**