

COMPLÉMENTS DU CHAPITRE 17

SECTION 17.8 Les médicaments

Voici quelques informations sur des médicaments fréquemment utilisés. Les pharmaciennes sont les mieux placées pour donner des conseils. Les professionnels de la santé et les mairaines d'allaitement peuvent également appeler à la ligne IMAGE de l'hôpital Ste-Justine au 514-345-2333.

www.chusj.org/fr/soins-services/P/Pharmacie/Centre-IMAGE

Tableau A1 Les antibiotiques

Médicaments les plus utilisés en allaitement	Transfert dans le lait	Effets secondaires pour la mère	Effets secondaires pour le bébé	Notes
Classe des pénicillines				
Pénicilline V Amoxicilline Cloxacilline Amoxi-clavulanate	Très faible	Nausées, diarrhées, rash	Rares : légère diarrhée possible	Courte demi-vie. Aussi utilisés en pédiatrie. La cloxacilline est un 1 ^{er} choix pour le traitement de la mastite infectieuse.
Classe des céphalosporines				
Céphalexine Céfadroxil Céfuroxime	Très faible	Diarrhées, rash	Rares : légère diarrhée possible	Courte demi-vie. Aussi utilisés en pédiatrie. La céphalexine est un 1 ^{er} choix pour le traitement de la mastite infectieuse.
Classe des macrolides				
Azithromycine Clarithromycine	Très faible à faible	Nausées, diarrhées. Goût métallique pour la clarithromycine.	De très rares cas de sténoses du pylore ont été rapportés.	Aussi utilisés en pédiatrie.

Tableau A1 Les antibiotiques (suite)

Médicaments les plus utilisés en allaitement	Transfert dans le lait	Effets secondaires pour la mère	Effets secondaires pour le bébé	Notes
Autres antibiotiques				
Métronidazole	Importante C'est pourquoi si une dose unique de 2 g est prescrite, on doit suspendre l'allaitement durant 12 heures, ce qui n'est pas le cas pour un traitement de plusieurs jours.	Nausées, diarrhées, maux de tête. Éviter l'alcool durant le traitement.	Aucun	Utilisé pour certaines infections post-césarienne et pour la vaginose bactérienne. Aussi utilisé en pédiatrie.

Tableau A2 Les analgésiques

Médicaments les plus utilisés en allaitement	Transfert dans le lait	Effets secondaires pour la mère	Effets secondaires pour le bébé	Notes
Acétaminophène (Tylenol, Atasol ou autre marque)	Faible à modéré	Rares : Toxicité du foie si utilisation chronique	Aucun rapporté	1 ^{er} choix de traitement. Très sécuritaire.
Classe des AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens)				
Ibuprofène (Advil, Motrin ou autre marque) Naproxène	Très faible à faible	Maux d'estomac, ulcères d'estomac, néphropathie.	Rares : somnolence, vomissement et très rarement des saignements rapportés	
Classe des opiacés				
Morphine Hydromorphone Oxycodone	Faible à modéré	Sédation, euphorie, nausée, vomissements, constipation.	Aucun rapporté, mais sédation/apnée théorique-ment possibles à hautes doses	Semble diminuer la libération d'ocytocine
Codéine	Faible	Sédation, constipation, dépression respiratoire.	Somnolence, constipation, alimentation difficile. Risque de surdose/apnée/décès : limiter la dose à 240 mg par jour.	